

Canigen® L4

La nueva baza contra la leptospirosis



L2 o L4: con Canigen® adapta la vacunación a cada situación



Virbac

Canigen[®] L4

Vacuna tetravalente vs. leptospirosis canina adaptada a la situación epidemiológica actual

12 meses de eficacia frente a los serovares actuales

Alternativa a la vacunación clásica vs. *Leptospira canicola* e *icterohemorragiae*. Ahora puedes proteger también contra serogrupos Australis y Grippotyphosa.

AUSTRALIS

GRIPPOTYPHOSA

+

CANICOLA

ICTEROHAEMORRHAGIAE



Composición	Unidades ELISA de masa antigénica
<i>Leptospira interrogans</i> Serogrupo Canicola Serovar Portland-vere (cepa Ca-12-000)	3.550 - 7.100
<i>Leptospira interrogans</i> Serogrupo Icterohaemorrhagiae Serovar Copenhageni (cepa Ic-02-001)	290 - 1.000
<i>Leptospira interrogans</i> Serogrupo Australis Serovar Bratislava (cepa As-05-073)	500 - 1.700
<i>Leptospira kirschneri</i> Serogrupo Grippotyphosa Serovar Dadas (cepa Gr-01-005)	650 - 1.300

Sin adyuvantes

Disponible en cajas con 10 viales de 1 ml (1 dosis)

Perfil de Canigen® L4

Dosificación

- Edad mínima: 6 semanas
- Primovacunación: 2 dosis a intervalo de 4 semanas
- Revacunación: 1 dosis anual
- Administración: Subcutánea

Reduce la infección y la excreción renal

Los estudios realizados confirman la eficacia de la vacuna durante 12 meses completos controlando la infección y la diseminación a través de la orina.

Formulación con nivel reducido de BSA (albumina sérica bovina)

Tecnología 'VacciPure'

- La BSA es una causa relevante de las reacciones vacunales por hipersensibilidad.
- Canigen® L4 tiene un nivel de BSA muy inferior al de otras vacunas, reduciendo el riesgo de reacciones anafilácticas.

Vacuna	Cantidad de BSA (mg/ml)
Canigen® L4	0,4
Vacuna A	4
Vacuna B	3,8
Vacuna C	6,3



Se puede administrar en perras gestantes

Combinable con Canigen® DHPPi
en la misma jeringuilla

La gama de biológicos Virbac evoluciona para ayudarte a realizar una vacunación

Protocolos generales de vacunación recomendados para perros y gatos

Primovacunación

- Mínimo 2 dosis de cada valencia con 3-4 semanas de intervalo.
- Última dosis no antes de los 3 meses.*

Revacunación anual

Perros En razas de alto riesgo en parvovirus (rottweiler, doberman, labrador, american staffordshire, pastor alemán, pitbull, perdiguero, husky siberiano y sabueso) se recomienda 5 dosis (las 2 primeras con Canigen® Cachorros 2b).

Vacuna exclusivamente animales sanos y correctamente desparasitados

*Actualmente, la WSAVA recomienda una dosis adicional en la semana 14-16



VACUNAS PARA GATOS

Feligen® CRP

Calicivirosis, panleucopenia y rinotraqueitis

Rabigen®

Rabia

Leucogen®

Leucemia

Leucofeligen® FeLV/RCP

Calicivirosis, panleucopenia, rinotraqueitis y leucemia



	Calicivirosis	Rinotraqueitis	Panleucopenia	Leucemia	Rabia
Leucogen®					
Feligen® CRP	●	●	●		
Leucofeligen® FeLV/RCP	●	●	●	●	
Rabigen®					●

