



# VIRBAMEC® F solución inyectable

## Antiparasitario endectocida en solución inyectable. Bovino.

**Composición por ml:** Ivermectina 10 mg, Clorsulón 100 mg.

### Indicaciones:

- Vermes redondos gastrointestinales (adultos y estado L4): *Ostertagia ostertagi*, *O. lyrata*, *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformi*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*, *Strongyloides papillosus* (adulto), *Nematodirus helvetianus* (adulto), *Nematodirus spathiger* (adulto).
- Vermes pulmonares (adulto y larva L4): *Dictyocaulus viviparus*.
- Trematodo del hígado (adulto): *Fasciola hepatica*.
- Hipodermosis o barros (estadios parasitarios): *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*.
- Ácaros: *Psoroptes bovis*, *Sarcoptes scabiei* var. *bovis*.
- Piojos chupadores: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*.
- El producto también se puede utilizar como ayuda en el control de infestaciones debidas a *Chorioptes bovis* pero es posible que no se produzca la eliminación completa.

### Posología y vía de administración:

El producto se debe administrar únicamente por vía subcutánea, en dosis única, a la dosis recomendada de 200 µg de ivermectina y 2 mg de clorsulón por kg de peso corporal. Cada ml contiene 10 mg de ivermectina y 100 mg de clorsulón, suficiente para tratar 50 kg de peso corporal.

### Tiempo de espera:

66 días para carne. No utilizar en animales productores de leche para el consumo humano ni en vacas lecheras que no están en lactación, incluyendo las vacas gestantes en los 2 meses anteriores al parto.

### Presentaciones:

Envase de 50, 200, 500 y 1.000 ml.



**Contraindicaciones:** No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a las sustancias activas del producto. No debe ser administrado a ninguna otra especie pues pueden producirse reacciones adversas graves e incluso la muerte, por ejemplo en perros. No administrar por vía intravenosa o intramuscular. **Precauciones:** Dividir la dosis superior a 10 ml en dos puntos de inyección para reducir el malestar ocasional o la reacción en el punto de inyección. **Reacciones adversas:** Se ha observado malestar transitorio en algunos animales tras la administración subcutánea. También se ha observado hinchazón de los tejidos blandos y/o ligero dolor en el punto de inyección. Estas reacciones desaparecen sin tratamiento. **Interacciones:** Los efectos de los agonistas GABA se incrementan con la ivermectina. **Conservación:** Conservar en envase original y protegido de la luz. Periodo de validez una vez abierto el envase: 28 días. Con prescripción veterinaria. **Número de registro:** I 643 ESP-VIRBAC. En caso de duda consulte con su veterinario.